



## Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

<b>Ikt.sz.:</b>	02.5/10040-1/2010
<b>Tárgy</b>	<b>DAMISOL levéltrágya család</b> forgalomba hozatali és felhasználási engedélye
<b>Ügyintéző:</b>	Olasz Zsuzsa
<b>Oldalak száma</b>	18
<b>Melléklet:</b>	forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **DAMISOL Agrokémiai Termékgyártó, Kereskedő és Forgalmazó KFT (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 1.) ügyfél** által a **DAMISOL levéltrágya család** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

### H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **DAMISOL levéltrágya család** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

**1. A készítmények kereskedelmi neve:** **DAMISOL BB Cukorrépa**

**DAMISOL BB Gabona**

**DAMISOL BB Gyümölcs I**

**DAMISOL BB Gyümölcs II**

**DAMISOL Bór koncentrátum**

**DAMISOL Kalcium**

**DAMISOL Kálium**

**DAMISOL Kén**

**DAMISOL Natúr**

**DAMISOL N:P:K=2:1:1**

**DAMISOL N:P:K=1:2:1**

**DAMISOL Speciál**

**DAMISOL Szőlő**

**2. A készítmények típusa:** műtrágya

**3. Gyártó:** DAMISOL Agrokémiai Termékgyártó, Kereskedő és Forgalmazó KFT

2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 1.

Statisztikai számjel: 10452422-2015-113-13

**Engedélyes:** DAMISOL Agrokémiai Termékgyártó, Kereskedő és Forgalmazó KFT

2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 1.

Statisztikai számjel: 10452422-2015-113-13

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** műtrágya, borostyánkősav, komplexképzők, kelátképzők

**Előírt minőségi feltételek*****DAMISOL BB Cukorrépa***

küllem: színtelen, vagy enyhén sárga színű, édeskés szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,6	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,24	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	17,0	
B tartalom (m/v%)		10,0	± 0,4
borostyánkősav tartalom (m/v%)		5,0	± 0,4
monoetanolamin tartalom (m/v%)		21,7	± 1,1
kristályosodás		4 °C alatt	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

***DAMISOL BB Gabona***

küllem: színtelen, vagy enyhén sárga színű, édeskés szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		8,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,22	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	17,0	
B tartalom (m/v%)		6,0	± 0,4
borostyánkősav tartalom (m/v%)		12,0	± 1,1
monoetanolamin tartalom (m/v%)		23,9	± 1,1
kristályosodás		4 °C alatt	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

***DAMISOL BB Gyümölcs I***

küllem: színtelen, vagy enyhén sárga színű, édeskés szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		8,3	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,09	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	17,0	
N tartalom (m/v%)		1,0	± 0,2
B tartalom (m/v%)		2,0	± 0,4
borostyánkősav tartalom (m/v%)		0,5	± 0,1
monoetanolamin tartalom (m/v%)		4,06	± 0,4
kristályosodás		5 °C alatt	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

### ***DAMISOL BB Gyümölcs II***

küllem: színtelen, vagy enyhén sárga színű, édeskés szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,25	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	17,0	
B tartalom (m/v%)		10,0	± 0,4
borostyánkősav tartalom (m/v%)		2,5	± 0,4
monoetanolamin tartalom (m/v%)		20,3	± 1,1
kristályosodás		4 °C alatt	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

### ***DAMISOL Bőrkoncentrátum I***

küllem: színtelen, édeskés szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		8,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,4	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	28,0	
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		18,0	± 1,1
B tartalom (m/v%)		7,5	± 0,4
glicerin tartalom (m/v%)		64,0	± 1,1
kristályosodás		5 °C alatt	
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

### ***DAMISOL Kalcium***

küllem: enyhén sárga színű, ecetszagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,25	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	28,0	
CaO tartalom (m/v%)		9,0	± 0,4
ecetsav tartalom (m/v%)		30,0	± 1,1
kristályosodás		5 °C alatt	
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

### ***DAMISOL Kálium***

küllem: színtelen, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		6,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	17,0	
N tartalom (m/v%)		1,2	± 0,24
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		4,0	± 0,4
kristályosodás		5 °C alatt	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

### ***DAMISOL Kén***

küllem: színtelen, ammónia szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		6,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,18	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	17,0	
N tartalom (m/v%)		8,0	± 0,4
SO <sub>3</sub> tartalom (m/v%)		27,4	± 1,1
kristályosodás		5 °C alatt	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

### ***DAMISOL Natúr***

küllem: barnászöld színű, ammónia szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
-----------	--	-------	------------------------

pH (eredeti oldatban)		8,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	17,0	
N tartalom (m/v%)		1,1	± 0,22
Mg tartalom (m/v%)		0,15	± 0,03
B tartalom (m/v%)		0,3	± 0,06
Cu tartalom (m/v%)		0,1	± 0,02
Fe tartalom (m/v%)		0,3	± 0,06
Mn tartalom (m/v%)		0,15	± 0,03
Zn tartalom (m/v%)		0,1	± 0,02
citromsav tartalom (m/v%)		1,5	± 0,3
EDTA-Na <sub>2</sub> tartalom (m/v%)		5,0	± 0,4
kristályosodás		2 °C alatt	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

**DAMISOL N:P:K=2:1:1**

küllem: színtelen, ammóniaszagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		8,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,04	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	17,0	
N tartalom (m/v%)		6,0	± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		3,0	± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		3,0	± 0,4
kristályosodás		5 °C alatt	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

**DAMISOL N:P:K=1:2:1**

küllem: színtelen, ammóniaszagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés

pH (eredeti oldatban)		8,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,01	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	17,0	
N tartalom (m/v%)		2,5	± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		5,0	± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		2,5	± 0,4
kristályosodás		5 °C alatt	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P2O5)	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

### ***DAMISOL Speciál***

küllem: világoszöld színű, ammónia szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		8,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	17,0	
N tartalom (m/v%)		2,0	± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		4,0	± 0,4
Mg tartalom (m/v%)		0,15	± 0,03
B tartalom (m/v%)		0,3	± 0,06
Cu tartalom (m/v%)		0,1	± 0,02
Fe tartalom (m/v%)		0,3	± 0,06
Mn tartalom (m/v%)		0,15	± 0,03
Zn tartalom (m/v%)		0,1	± 0,02
citromsav tartalom (m/v%)		1,5	± 0,3
EDTA-Na <sub>2</sub> tartalom (m/v%)		5,0	± 0,4
kristályosodás		2 °C alatt	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	



Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

### **DAMISOL Szőlő**

küllem: barnászöld színű, ammónia szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		8,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,14	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	17,0	
N tartalom (m/v%)		2,4	± 0,4
Mg tartalom (m/v%)		1,0	± 0,2
Cu tartalom (m/v%)		0,33	± 0,066
Fe tartalom (m/v%)		1,0	± 0,2
Zn tartalom (m/v%)		1,0	± 0,2
citromsav tartalom (m/v%)		1,5	± 0,3
EDTA-Na <sub>2</sub> tartalom (m/v%)		5,0	± 0,4
kristályosodás		2 °C alatt	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

### **5. Felhasználható:**

#### **DAMISOL BB Cukorrépa**

- cukorrépa *levéltrágyázására*, főleg a korai szedésre tervezett területeken, a cukorhozam fokozására, a szedés kezdete előtt 3 héttel 10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben kijuttatva,
- repace *levéltrágyázására*, a termésmennyiség fokozására zöldbimbós állapotban 10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben kijuttatva,
- napraforgó *levéltrágyázására* a tányérkezdemények megjelenésekor 10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben kijuttatva,
- szőlő *levéltrágyázására* a cukorképződés fokozására az érés kezdetén (szüret előtt 3 héttel) 10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben kijuttatva.

#### **DAMISOL BB Gabona**

- őszi búza, őszi árpa és tavaszi árpa *levéltrágyázására* az első szárcsomó megjelenése után közvetlenül 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 5 %-os töménységben kijuttatva,
- kukorica *levéltrágyázására* 4-6 leveles állapotban 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 5 %-os töménységben kijuttatva,
- pritamín- és fűszerpaprika *levéltrágyázására*, az együttlérés javítására, a színanyagképzés

fokozására, a fő szedés előtt 3 héttel 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben kijuttatva,

- determinált érésű paradicsom *levéltrágyázására*, a szénhidrát képzés fokozására, a fő szedés előtt 3 héttel 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben kijuttatva,
- gyümölcsfélék *levéltrágyázására*, a virágzáskori lehülés okozta károk mérséklésére, fagy előtt, vagy a fagy után közvetlenül kijuttatva a károk megelőzésére, mérséklésére, a virágok regenerálódásának elősegítésére 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben kijuttatva.

### **DAMISOL BB Gyümölcs I**

- gyümölcsfélék *levéltrágyázására*, a kötődés fokozására, almában, körtében a virágzás előtt, majd szíromhullás után 20 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, csonthéjasokban a lombzat megjelenése után, majd a szüret után 20 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben kijuttatva,
- paprika, paradicsom, bab, lencse, borsó *levéltrágyázására*, a kötődés fokozására, a virágbimbók megjelenése előtt 20 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben kijuttatva.

### **DAMISOL BB Gyümölcs II**

- gyümölcsfélék *levéltrágyázására*, a kötődés fokozására: almában, körtében a virágzás előtt, majd szíromhullás után 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5%-os töménységben, csonthéjasokban a lombzat megjelenése után, majd a szüret után 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1,0 %-os töménységben kijuttatva,
- paprika, paradicsom, bab, lencse, borsó *levéltrágyázására*, a kötődés fokozására, a virágbimbók megjelenése előtt 4 l/ha mennyiségben legfeljebb 0,5 %-os töménységben kijuttatva.

### **DAMISOL Bór koncentrátum**

- almatermésűek *levéltrágyázására*, a kötődés fokozására, virágbimbós állapotban, majd szíromhullás után 5 l/ha mennyiségben legfeljebb 1 %-os töménységben kijuttatva,
- cseresznye, meggy, szilva *levéltrágyázására*, a kötődés fokozására virágbimbós állapotban 5 l/ha mennyiségben legfeljebb 1 %-os töménységben, bórhiány esetén szüret után 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben kijuttatva,
- őszibarack, kajszli *levéltrágyázására*, a kilombosodás után közvetlenül és szüret után 4-5 l/ha mennyiségben, 1%-os töménységben kijuttatva,
- szamóca *levéltrágyázására*, a rügydifferenciálódás elősegítésére augusztus közepén, 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben kijuttatva,
- szőlő *levéltrágyázására*, a kötődés fokozására a fűrtkezdemények megnyúlásakor 5 l/ha, majd a kötődés után 3-4 l/ha, a cukorfok növelésére a bogyók zsendülésekor 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben kijuttatva,
- cukorrépa *levéltrágyázására*, a bórhiány megszüntetésére lombzáródás után és augusztusban 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben kijuttatva,
- napraforgó *levéltrágyázására*, a megtermékenyülés fokozására a tányérkezdemények 8-10 cm-es nagyságában 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben kijuttatva,
- burgonya *levéltrágyázására*, a gumók kötődésének fokozására, a virágzás kezdetén 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben kijuttatva,

- bab, paradicsom, paprika, dinnyefélék, uborka, lencse, borsó *levéltrágyázására* a kötődés fokozására, a virágzás előtt közvetlenül 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben kijuttatva, a folyton virágzó fajoknál, fajtáknál az első kezelés után 6 héttel megismételve,
- karfiol *levéltrágyázására* a barnafoltosság megelőzésére, a fejek kialakulásának kezdetén 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben kijuttatva,
- gerbera, szegfű *levéltrágyázására*, bimbórepedésének megakadályozására, illetve a nagyméretű és szép színű virágok kialakulásának elősegítésére, bimbós állapotban, 2 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben kijuttatva, majd szükség szerint 3 hét múlva ismételve.

### **DAMISOL Kalcium**

- almatermésűek *levéltrágyázására*, a tárolhatóság javítására, a kalciumhiány pótlására, 5-10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a gyümölcsök kisdíó nagyságától kezdve a szüretig legalább 4 alkalommal kijuttatva,
- paprika, paradicsom, uborka és dinnyefélék *levéltrágyázására* az un. szárazfoltosság ellen, 10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben, az első kötések kialakulásakor, majd további 1-2 alkalommal, elsősorban száraz időjárási körülmények között kijuttatva.

### **DAMISOL Kálium**

Gyümölcs, szőlő, dísznövény, zöldség, dohány kultúrák *levéltrágyázására*, 10-30 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben, a tenyészidőszak során 2-3 alkalommal kijuttatva, különösen a nyári szárazság esetén, illetve olyan talajokon, ahol a csapadékmentes időszakokban a kálium nehezen vehető fel.

### **DAMISOL Kén**

- repce *levéltrágyázására*, a „fehérvirágúság” megelőzésére virágzás előtt 5-10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben kijuttatva,
- fűfélék *levéltrágyázására*, április-májusban a kénhiány gyógyítására, 5-10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben kijuttatva,
- kalászosok *levéltrágyázására* kalászhányás után a kénhiány gyógyítására 5-10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben kijuttatva,
- szőlő *levéltrágyázására* virágzás után, 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben kijuttatva,
- napraforgó *levéltrágyázására* a tányérkezdemények megjelenésekor 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben kijuttatva.

### **DAMISOL Natúr**

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra *levéltrágyázására*, általános kondíciójának javítására, az egyoldalú műtrágyázás okozta mikroelemhiányok ellensúlyozására, gyógyítására 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, a tenyészidőszak alatt 2-3 alkalommal kijuttatva.

*Évente összesen legfeljebb 20 l/ha juttatható ki!*

**DAMISOL N:P:K=2:1:1 és DAMISOL N:P:K=1:2:1**

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra

- *levéltrágyázására* 5-10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1,5 %-os töménységben, a tenyészidőszak alatt legalább 3 alkalommal, 2 hetes időközökben kijuttatva,
- *talajtrágyázására* 10-20 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben, a tenyészidőszak alatt 5-6 alkalommal kijuttatva.

**DAMISOL Speciál**

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra *levéltrágyázására*, a növények általános kondíciójának javítására, kálium hiányának pótlására 5-10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, a tenyészidőszak alatt 2-3 alkalommal, 2 hetes időközökben kijuttatva.

*Évente összesen legfeljebb 20 l/ha juttatható ki!*

**DAMISOL Szőlő**

- *szőlő levéltrágyázására*, az intenzív hajtásnövekedés időszakában jelentkező vas-és magnézium klorózis, illetve cinkhiány megszüntetésére, 5-10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben, szükség szerint 2-3 alkalommal kijuttatva,
- *őszibarack levéltrágyázására*, a vas és magnézium klorózis megszüntetésére, a tünetek megjelenésekor 5-10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, szükség szerint 3 alkalommal megismételve.

**6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok****6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:**

**Nem jelölésköteles:**

- **DAMISOL BB Gyümölcs I**
- **DAMISOL Kálium**
- **DAMISOL N:P:K=2:1:1**



- *DAMISOL BB Cukorrépa*
- *DAMISOL BB Gabona*
- *DAMISOL BB Gyümölcs II*
- *DAMISOL Bór koncentrátum*

**Xi**



**irritatív**

- *DAMISOL Kalcium*
- *DAMISOL Kén*
- *DAMISOL N:P:K=1:2:1*
- *DAMISOL Szőlő*

**N**



**környezeti veszély**

- *DAMISOL Natúr*
- *DAMISOL N:P:K=1:2:1*
- *DAMISOL Speciál*
- *DAMISOL Szőlő*

**C**



**Maró**

- *DAMISOL BB Cukorrépa*
- *DAMISOL BB Gabona*
- *DAMISOL BB Gyümölcs II*
- *DAMISOL Bór koncentrátum*
- *DAMISOL Kalcium*
- *DAMISOL N:P:K=1:2:1*
- *DAMISOL Szőlő*

**6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -**

**Nem jelölésköteles**

- *DAMISOL BB Gyümölcs I*
- *DAMISOL Kálium*
- *DAMISOL N:P:K=2:1:1*

**R 20/21/22** Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas

- *DAMISOL BB Cukorrépa*
- *DAMISOL BB Gabona*
- *DAMISOL BB Gyümölcs II*
- *DAMISOL Bór koncentrátum*

**R 34** Égési sérülést okoz

- *DAMISOL BB Cukorrépa*
- *DAMISOL BB Gabona*
- *DAMISOL BB Gyümölcs II*
- *DAMISOL N:P:K=1:2:1*
- *DAMISOL Szőlő*

**R 35** Súlyos égési sérülést okoz

- *DAMISOL Bór koncentrátum*
- *DAMISOL Kalcium*

**R 36/38** Szem- és bőrizgató hatású

- *DAMISOL Kalcium*

**R 36/37/38** Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

- *DAMISOL BB Cukorrépa*
- *DAMISOL BB Gabona*
- *DAMISOL BB Gyümölcs II*
- *DAMISOL Bór koncentrátum*
- *DAMISOL Kén*
- *DAMISOL N:P:K=1:2:1*
- *DAMISOL Szőlő*

**R 50** Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

- *DAMISOL N:P:K=1:2:1*

**R 51/53** Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

- *DAMISOL Natúr*
- *DAMISOL Speciál*
- *DAMISOL Szőlő*

### 6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

**S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet.

- *DAMISOL BB Cukorrépa*
- *DAMISOL BB Gabona*

- **DAMISOL BB Gyümölcs I**
- **DAMISOL BB Gyümölcs II**
- **DAMISOL Bór koncentrátum**
- **DAMISOL Kalcium**
- **DAMISOL Kálium**
- **DAMISOL Kén**
- **DAMISOL Natúr**
- **DAMISOL N:P:K=2:1:1**
- **DAMISOL N:P:K=1:2:1**
- **DAMISOL Speciál**
- **DAMISOL Szőlő**

**S 13** Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.

- **DAMISOL BB Cukorrépa**
- **DAMISOL BB Gabona**
- **DAMISOL BB Gyümölcs I**
- **DAMISOL BB Gyümölcs II**
- **DAMISOL Bór koncentrátum**
- **DAMISOL Kalcium**
- **DAMISOL Kálium**
- **DAMISOL Kén**
- **DAMISOL Natúr**
- **DAMISOL N:P:K=2:1:1**
- **DAMISOL N:P:K=1:2:1**
- **DAMISOL Speciál**
- **DAMISOL Szőlő**

**S 20/21** A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

- **DAMISOL BB Cukorrépa**
- **DAMISOL BB Gabona**
- **DAMISOL BB Gyümölcs I**
- **DAMISOL BB Gyümölcs II**
- **DAMISOL Bór koncentrátum**
- **DAMISOL Kalcium**
- **DAMISOL Kálium**
- **DAMISOL Kén**
- **DAMISOL Natúr**
- **DAMISOL N:P:K=2:1:1**
- **DAMISOL N:P:K=1:2:1**
- **DAMISOL Speciál**
- **DAMISOL Szőlő**

**S 23** A keletkező gázt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni

- **DAMISOL BB Cukorrépa**
- **DAMISOL BB Gabona**
- **DAMISOL BB Gyümölcs II**
- **DAMISOL Bór koncentrátum**
- **DAMISOL N:P:K=1:2:1**

- **DAMISOL Szőlő**

**S 24/25** Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

- **DAMISOL BB Cukorrépa**
- **DAMISOL BB Gabona**
- **DAMISOL BB Gyümölcs I**
- **DAMISOL BB Gyümölcs II**
- **DAMISOL Bór koncentrátum**
- **DAMISOL Kalcium**
- **DAMISOL Kálium**
- **DAMISOL Kén**
- **DAMISOL Natúr**
- **DAMISOL N:P:K=2:1:1**
- **DAMISOL N:P:K=1:2:1**
- **DAMISOL Speciál**
- **DAMISOL Szőlő**

**S 26** Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

- **DAMISOL Kén**

**S 36/37/39** Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

- **DAMISOL BB Cukorrépa**
- **DAMISOL BB Gabona**
- **DAMISOL BB Gyümölcs I**
- **DAMISOL BB Gyümölcs II**
- **DAMISOL Bór koncentrátum**
- **DAMISOL Kalcium**
- **DAMISOL Kálium**
- **DAMISOL Kén**
- **DAMISOL Natúr**
- **DAMISOL N:P:K=2:1:1**
- **DAMISOL N:P:K=1:2:1**
- **DAMISOL Speciál**
- **DAMISOL Szőlő**

**S 57** A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni.

- **DAMISOL Natúr**
- **DAMISOL N:P:K=1:2:1**
- **DAMISOL Speciál**
- **DAMISOL Szőlő**

**S 61** Kerülni kell az anyag környezetbe jutását

- **DAMISOL Szőlő**

**6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő:** 0 nap

**6.5. Munkaegészségügyi előírások:**



Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, a munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

#### **6.6. Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak:**

Védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli. Lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

#### **6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

#### **7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

#### **9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 1-5-10-20-60 literes polietilén palack ill. ballon

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, de fagymentes, + 5°C feletti hőmérsékletű, fedett helyen, eredeti, zárt csomagolásban

**9.4. Eltarthatóság ideje:** 2 év

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310590

**11. Egyéb előírások:** -

**12. Az engedély érvényessége:** 2020. június 9.

Az engedélyezési eljárás díja 445.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

## **INDOKOLÁS**

A határozat indokolás része nem nyilvános.

**Budapest, 2010. június 9.**

**MgSzH  
elnök  
nevében és megbízásából**

**Tóthné Lippai Edit  
igazgató**

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár

**Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ**

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság  
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

---

02.5/10040-1/2010 MgSzH Központ számú határozat melléklete

**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT**

1. A készítmények kereskedelmi neve: *DAMISOL BB Cukorrépa*  
*DAMISOL BB Gabona*  
*DAMISOL BB Gyümölcs I*  
*DAMISOL BB Gyümölcs II*  
*DAMISOL Bór koncentrátum*  
*DAMISOL Kalcium*  
*DAMISOL Kálium*  
*DAMISOL Kén*  
*DAMISOL Natúr*  
*DAMISOL N:P:K=2:1:1*  
*DAMISOL N:P:K=1:2:1*  
*DAMISOL Speciál*  
*DAMISOL Szőlő*

2. A készítmények típusa: műtrágya

3. Gyártó: DAMISOL Agrokémiai Termékgyártó, Kereskedő és Forgalmazó KFT  
2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 1.  
Statisztikai számjel: 10452422-2015-113-13

Engedélyes: DAMISOL Agrokémiai Termékgyártó, Kereskedő és Forgalmazó KFT  
2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 1.  
Statisztikai számjel: 10452422-2015-113-13

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: műtrágya, borostyánkősav, komplexképzők, kelátképzők

**Előírt minőségi feltételek*****DAMISOL BB Cukorrépa***

küllem: színtelen, vagy enyhén sárga színű, édeskés szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,6	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,24	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	17,0	
B tartalom (m/v%)		10,0	± 0,4
borostyánkősav tartalom (m/v%)		5,0	± 0,4
monoetanolamin tartalom (m/v%)		21,7	± 1,1
kristályosodás		4 °C alatt	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

***DAMISOL BB Gabona***

küllem: színtelen, vagy enyhén sárga színű, édeskés szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		8,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,22	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	17,0	
B tartalom (m/v%)		6,0	± 0,4
borostyánkősav tartalom (m/v%)		12,0	± 1,1
monoetanolamin tartalom (m/v%)		23,9	± 1,1
kristályosodás		4 °C alatt	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

***DAMISOL BB Gyümölcs I***

küllem: színtelen, vagy enyhén sárga színű, édeskés szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		8,3	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,09	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	17,0	
N tartalom (m/v%)		1,0	± 0,2
B tartalom (m/v%)		2,0	± 0,4
borostyánkősav tartalom (m/v%)		0,5	± 0,1
monoetanolamin tartalom (m/v%)		4,06	± 0,4
kristályosodás		5 °C alatt	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

### ***DAMISOL BB Gyümölcs II***

küllem: színtelen, vagy enyhén sárga színű, édeskés szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,25	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	17,0	
B tartalom (m/v%)		10,0	± 0,4
borostyánkősav tartalom (m/v%)		2,5	± 0,4
monoetanolamin tartalom (m/v%)		20,3	± 1,1
kristályosodás		4 °C alatt	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

### ***DAMISOL Bőrkoncentrátum I***

küllem: színtelen, édeskés szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		8,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,4	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	28,0	
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		18,0	± 1,1
B tartalom (m/v%)		7,5	± 0,4
glicerín tartalom (m/v%)		64,0	± 1,1
kristályosodás		5 °C alatt	
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

### ***DAMISOL Kalcium***

küllem: enyhén sárga színű, ecetszagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		4,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,25	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	28,0	
CaO tartalom (m/v%)		9,0	± 0,4
ecetsav tartalom (m/v%)		30,0	± 1,1
kristályosodás		5 °C alatt	
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

### ***DAMISOL Kálium***

küllem: színtelen, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		6,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	17,0	
N tartalom (m/v%)		1,2	± 0,24
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		4,0	± 0,4
kristályosodás		5 °C alatt	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

### ***DAMISOL Kén***

küllem: színtelen, ammónia szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		6,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,18	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	17,0	
N tartalom (m/v%)		8,0	± 0,4
SO <sub>3</sub> tartalom (m/v%)		27,4	± 1,1
kristályosodás		5 °C alatt	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

### ***DAMISOL Natúr***

küllem: barnászöld színű, ammónia szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		8,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	17,0	
N tartalom (m/v%)		1,1	± 0,22
Mg tartalom (m/v%)		0,15	± 0,03
B tartalom (m/v%)		0,3	± 0,06
Cu tartalom (m/v%)		0,1	± 0,02
Fe tartalom (m/v%)		0,3	± 0,06
Mn tartalom (m/v%)		0,15	± 0,03
Zn tartalom (m/v%)		0,1	± 0,02
citromsav tartalom (m/v%)		1,5	± 0,3
EDTA-Na <sub>2</sub> tartalom (m/v%)		5,0	± 0,4
kristályosodás		2 °C alatt	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

**DAMISOL N:P:K=2:1:1**

küllem: színtelen, ammóniaszagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		8,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,04	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	17,0	
N tartalom (m/v%)		6,0	± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		3,0	± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		3,0	± 0,4
kristályosodás		5 °C alatt	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

**DAMISOL N:P:K=1:2:1**

küllem: színtelen, ammóniaszagú folyadék



Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		8,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,01	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	17,0	
N tartalom (m/v%)		2,5	± 0,4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/v%)		5,0	± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		2,5	± 0,4
kristályosodás		5 °C alatt	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P2O5)	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

### ***DAMISOL Speciál***

küllem: világoszöld színű, ammónia szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		8,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	17,0	
N tartalom (m/v%)		2,0	± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/v%)		4,0	± 0,4
Mg tartalom (m/v%)		0,15	± 0,03
B tartalom (m/v%)		0,3	± 0,06
Cu tartalom (m/v%)		0,1	± 0,02
Fe tartalom (m/v%)		0,3	± 0,06
Mn tartalom (m/v%)		0,15	± 0,03
Zn tartalom (m/v%)		0,1	± 0,02
citromsav tartalom (m/v%)		1,5	± 0,3
EDTA-Na <sub>2</sub> tartalom (m/v%)		5,0	± 0,4
kristályosodás		2 °C alatt	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	

Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

### **DAMISOL Szőlő**

küllem: barnászöld színű, ammónia szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		8,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,14	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	17,0	
N tartalom (m/v%)		2,4	± 0,4
Mg tartalom (m/v%)		1,0	± 0,2
Cu tartalom (m/v%)		0,33	± 0,066
Fe tartalom (m/v%)		1,0	± 0,2
Zn tartalom (m/v%)		1,0	± 0,2
citromsav tartalom (m/v%)		1,5	± 0,3
EDTA-Na <sub>2</sub> tartalom (m/v%)		5,0	± 0,4
kristályosodás		2 °C alatt	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

### **5. Felhasználható:**

#### **DAMISOL BB Cukorrépa**

- cukorrépa *levéltrágyázására*, főleg a korai szedésre tervezett területeken, a cukorhozam fokozására, a szedés kezdete előtt 3 héttel 10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben kijuttatva,
- repce *levéltrágyázására*, a termés mennyiség fokozására zöldbimbós állapotban 10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben kijuttatva,
- napraforgó *levéltrágyázására* a tányérkezdemények megjelenésekor 10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben kijuttatva,
- szőlő *levéltrágyázására* a cukorképződés fokozására az érés kezdetén (szüret előtt 3 héttel) 10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben kijuttatva.

#### **DAMISOL BB Gabona**

- őszi búza, őszi árpa és tavaszi árpa *levéltrágyázására* az első szárcsomó megjelenése után közvetlenül 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 5 %-os töménységben kijuttatva,
- kukorica *levéltrágyázására* 4-6 leveles állapotban 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 5 %-os

- töménységben kijuttatva,
- pritamin- és fűszerpaprika *levéltrágyázására*, az együttérés javítására, a színanyagképzés fokozására, a fő szedés előtt 3 héttel 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben kijuttatva,
  - determinált érésű paradicsom *levéltrágyázására*, a színanyag és szénhidrát képzés fokozására, a fő szedés előtt 3 héttel 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben kijuttatva,
  - gyümölcsfélék *levéltrágyázására*, a virágzaskori lehülés okozta károk mérséklésére, fagy előtt, vagy a fagy után közvetlenül kijuttatva a károk megelőzésére, mérséklésére, a virágok regenerálódásának elősegítésére 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben kijuttatva.

### ***DAMISOL BB Gyümölcs I***

- gyümölcsfélék *levéltrágyázására*, a kötődés fokozására, almában, körtében a virágzás előtt, majd szíromhullás után 20 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, csonthéjasokban a lombozat megjelenése után, majd a szüret után 20 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben kijuttatva,
- paprika, paradicsom, bab, lencse, borsó *levéltrágyázására*, a kötődés fokozására, a virágbimbók megjelenése előtt 20 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben kijuttatva.

### ***DAMISOL BB Gyümölcs II***

- gyümölcsfélék *levéltrágyázására*, a kötődés fokozására: almában, körtében a virágzás előtt, majd szíromhullás után 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5%-os töménységben, csonthéjasokban a lombozat megjelenése után, majd a szüret után 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1,0 %-os töménységben kijuttatva,
- paprika, paradicsom, bab, lencse, borsó *levéltrágyázására*, a kötődés fokozására, a virágbimbók megjelenése előtt 4 l/ha mennyiségben legfeljebb 0,5 %-os töménységben kijuttatva.

### ***DAMISOL Bór koncentrátum***

- almatermésűek *levéltrágyázására*, a kötődés fokozására, virágbimbós állapotban, majd szíromhullás után 5 l/ha mennyiségben legfeljebb 1 %-os töménységben kijuttatva,
- cseresznye, meggy, szilva *levéltrágyázására*, a kötődés fokozására virágbimbós állapotban 5 l/ha mennyiségben legfeljebb 1 %-os töménységben, bórhiány esetén szüret után 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben kijuttatva,
- őszibarack, kajszli *levéltrágyázására*, a kilombosodás után közvetlenül és szüret után 4-5 l/ha mennyiségben, 1%-os töménységben kijuttatva,
- szamóca *levéltrágyázására*, a rügydifferenciálódás elősegítésére augusztus közepén, 4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben kijuttatva,
- szőlő *levéltrágyázására*, a kötődés fokozására a fűrtkezdemények megnyúlásakor 5 l/ha, majd a kötődés után 3-4 l/ha, a cukorfok növelésére a bogyók zsendülésekor 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben kijuttatva,
- cukorrépa *levéltrágyázására*, a bórhiány megszüntetésére lombzáródás után és augusztusban 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben kijuttatva,
- napraforgó *levéltrágyázására*, a megtermékenyülés fokozására a tányérkezdemények 8-10 cm-es nagyságában 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben kijuttatva,

- burgonya *levéltrágyázására*, a gumók kötődésének fokozására, a virágzás kezdetén 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben kijuttatva,
- bab, paradicsom, paprika, dinnyefélék, uborka, lencse, borsó *levéltrágyázására* a kötődés fokozására, a virágzás előtt közvetlenül 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben kijuttatva, a folyton virágzó fajoknál, fajtáknál az első kezelés után 6 héttel megismételve,
- karfiol *levéltrágyázására* a barnafoltosság megelőzésére, a fejek kialakulásának kezdetén 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben kijuttatva,
- gerbera, szegfű *levéltrágyázására*, bimbórepedésének megakadályozására, illetve a nagyméretű és szép színű virágok kialakulásának elősegítésére, bimbós állapotban, 2 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben kijuttatva, majd szükség szerint 3 hét múlva ismételve.

### **DAMISOL Kalcium**

- almatermésűek *levéltrágyázására*, a tárolhatóság javítására, a kalciumhiány pótlására, 5-10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben, a gyümölcsök kisdíó nagyságától kezdve a szüretig legalább 4 alkalommal kijuttatva,
- paprika, paradicsom, uborka és dinnyefélék *levéltrágyázására* az un. szárazfoltosság ellen, 10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben, az első kötések kialakulásakor, majd további 1-2 alkalommal, elsősorban száraz időjárási körülmények között kijuttatva.

### **DAMISOL Kálium**

Gyümölcs, szőlő, dísznövény, zöldség, dohány kultúrák *levéltrágyázására*, 10-30 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben, a tenyészidőszak során 2-3 alkalommal kijuttatva, különösen a nyári szárazság esetén, illetve olyan talajokon, ahol a csapadékmentes időszakokban a kálium nehezen vehető fel.

### **DAMISOL Kén**

- repce *levéltrágyázására*, a „fehérvirágúság” megelőzésére virágzás előtt 5-10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben kijuttatva,
- fűfélék *levéltrágyázására*, április-májusban a kénhiány gyógyítására, 5-10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben kijuttatva,
- kalászosok *levéltrágyázására* kalászhányás után a kénhiány gyógyítására 5-10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben kijuttatva,
- szőlő *levéltrágyázására* virágzás után, 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben kijuttatva,
- napraforgó *levéltrágyázására* a tányérkezdemények megjelenésekor 5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben kijuttatva.

### **DAMISOL Natúr**

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra *levéltrágyázására*, általános kondíciójának javítására, az egyoldalú műtrágyázás okozta mikroelemhiányok ellensúlyozására, gyógyítására 4-5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, a tenyészidőszak alatt

2-3 alkalommal kijuttatva.

*Évente összesen legfeljebb 20 l/ha juttatható ki!*

***DAMISOL N:P:K=2:1:1 és DAMISOL N:P:K=1:2:1***

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra

- *levéltrágyázására* 5-10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1,5 %-os töménységben, a tenyészidőszak alatt legalább 3 alkalommal, 2 hetes időközökben kijuttatva,
- *talajtrágyázására* 10-20 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben, a tenyészidőszak alatt 5-6 alkalommal kijuttatva.

***DAMISOL Speciál***

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra *levéltrágyázására*, a növények általános kondíciójának javítására, kálium hiányának pótlására 5-10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, a tenyészidőszak alatt 2-3 alkalommal, 2 hetes időközökben kijuttatva.

*Évente összesen legfeljebb 20 l/ha juttatható ki!*

***DAMISOL Szőlő***

- *szőlő levéltrágyázására*, az intenzív hajtásnövekedés időszakában jelentkező vas-és magnézium klorózis, illetve cinkhiány megszüntetésére, 5-10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben, szükség szerint 2-3 alkalommal kijuttatva,
- *őszibarack levéltrágyázására*, a vas és magnézium klorózis megszüntetésére, a tünetek megjelenésekor 5-10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 2 %-os töménységben, szükség szerint 3 alkalommal megismételve.

**6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok**

**6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:**

**Nem jelölésköteles:**

- ***DAMISOL BB Gyümölcs I***
- ***DAMISOL Kálium***
- ***DAMISOL N:P:K=2:1:1***

Xn



**ártalmas**

- *DAMISOL BB Cukorrépa*
- *DAMISOL BB Gabona*
- *DAMISOL BB Gyümölcs II*
- *DAMISOL Bór koncentrátum*

**Xi****irritatív**

- *DAMISOL Kalcium*
- *DAMISOL Kén*
- *DAMISOL N:P:K=1:2:1*
- *DAMISOL Szőlő*

**N****környezeti veszély**

- *DAMISOL Natúr*
- *DAMISOL N:P:K=1:2:1*
- *DAMISOL Speciál*
- *DAMISOL Szőlő*

**C****Maró**

- *DAMISOL BB Cukorrépa*
- *DAMISOL BB Gabona*
- *DAMISOL BB Gyümölcs II*
- *DAMISOL Bór koncentrátum*
- *DAMISOL Kalcium*
- *DAMISOL N:P:K=1:2:1*
- *DAMISOL Szőlő*

**6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -**

**Nem jelölésköteles**

- *DAMISOL BB Gyümölcs I*

- **DAMISOL Kálium**
- **DAMISOL N:P:K=2:1:1**

**R 20/21/22** Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas

- **DAMISOL BB Cukorrépa**
- **DAMISOL BB Gabona**
- **DAMISOL BB Gyümölcs II**
- **DAMISOL Bór koncentrátum**

**R 34** Égési sérülést okoz

- **DAMISOL BB Cukorrépa**
- **DAMISOL BB Gabona**
- **DAMISOL BB Gyümölcs II**
- **DAMISOL N:P:K=1:2:1**
- **DAMISOL Szőlő**

**R 35** Súlyos égési sérülést okoz

- **DAMISOL Bór koncentrátum**
- **DAMISOL Kalcium**

**R 36/38** Szem- és bőrizgató hatású

- **DAMISOL Kalcium**

**R 36/37/38** Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

- **DAMISOL BB Cukorrépa**
- **DAMISOL BB Gabona**
- **DAMISOL BB Gyümölcs II**
- **DAMISOL Bór koncentrátum**
- **DAMISOL Kén**
- **DAMISOL N:P:K=1:2:1**
- **DAMISOL Szőlő**

**R 50** Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

- **DAMISOL N:P:K=1:2:1**

**R 51/53** Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

- **DAMISOL Natúr**
- **DAMISOL Speciál**
- **DAMISOL Szőlő**

### 6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

**S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet.

- **DAMISOL BB Cukorrépa**
- **DAMISOL BB Gabona**
- **DAMISOL BB Gyümölcs I**
- **DAMISOL BB Gyümölcs II**
- **DAMISOL Bór koncentrátum**
- **DAMISOL Kalcium**
- **DAMISOL Kálium**
- **DAMISOL Kén**
- **DAMISOL Natúr**
- **DAMISOL N:P:K=2:1:1**
- **DAMISOL N:P:K=1:2:1**
- **DAMISOL Speciál**
- **DAMISOL Szőlő**

**S 13** Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.

- **DAMISOL BB Cukorrépa**
- **DAMISOL BB Gabona**
- **DAMISOL BB Gyümölcs I**
- **DAMISOL BB Gyümölcs II**
- **DAMISOL Bór koncentrátum**
- **DAMISOL Kalcium**
- **DAMISOL Kálium**
- **DAMISOL Kén**
- **DAMISOL Natúr**
- **DAMISOL N:P:K=2:1:1**
- **DAMISOL N:P:K=1:2:1**
- **DAMISOL Speciál**
- **DAMISOL Szőlő**

**S 20/21** A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

- **DAMISOL BB Cukorrépa**
- **DAMISOL BB Gabona**
- **DAMISOL BB Gyümölcs I**
- **DAMISOL BB Gyümölcs II**
- **DAMISOL Bór koncentrátum**
- **DAMISOL Kalcium**
- **DAMISOL Kálium**
- **DAMISOL Kén**
- **DAMISOL Natúr**
- **DAMISOL N:P:K=2:1:1**
- **DAMISOL N:P:K=1:2:1**
- **DAMISOL Speciál**
- **DAMISOL Szőlő**

**S 23** A keletkező gázt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni

- **DAMISOL BB Cukorrépa**
- **DAMISOL BB Gabona**
- **DAMISOL BB Gyümölcs II**



- **DAMISOL Bór koncentrátum**
- **DAMISOL N:P:K=1:2:1**
- **DAMISOL Szőlő**

**S 24/25** Kerülni kell a bõrrel való érintkezést és a szembejutást

- **DAMISOL BB Cukorrépa**
- **DAMISOL BB Gabona**
- **DAMISOL BB Gyümölcs I**
- **DAMISOL BB Gyümölcs II**
- **DAMISOL Bór koncentrátum**
- **DAMISOL Kalcium**
- **DAMISOL Kálium**
- **DAMISOL Kén**
- **DAMISOL Natúr**
- **DAMISOL N:P:K=2:1:1**
- **DAMISOL N:P:K=1:2:1**
- **DAMISOL Speciál**
- **DAMISOL Szőlő**

**S 26** Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

- **DAMISOL Kén**

**S 36/37/39** Megfelelő védõruházatot, védõkesztyűt és szem-/arcvédõt kell viselni

- **DAMISOL BB Cukorrépa**
- **DAMISOL BB Gabona**
- **DAMISOL BB Gyümölcs I**
- **DAMISOL BB Gyümölcs II**
- **DAMISOL Bór koncentrátum**
- **DAMISOL Kalcium**
- **DAMISOL Kálium**
- **DAMISOL Kén**
- **DAMISOL Natúr**
- **DAMISOL N:P:K=2:1:1**
- **DAMISOL N:P:K=1:2:1**
- **DAMISOL Speciál**
- **DAMISOL Szőlő**

**S 57** A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni.

- **DAMISOL Natúr**
- **DAMISOL N:P:K=1:2:1**
- **DAMISOL Speciál**
- **DAMISOL Szőlő**

**S 61** Kerülni kell az anyag környezetbe jutását

- **DAMISOL Szőlő**

**6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő:** 0 nap

**6.5. Munkaegészségügyi előírások:**

Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, a munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

**6.6. Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak:**

Védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli. Lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

**6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

**7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

**9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 1-5-10-20-60 literes polietilén palack ill. ballon

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, de fagymentes, + 5°C feletti hőmérsékletű, fedett helyen, eredeti, zárt csomagolásban

**9.4. Eltarthatóság ideje:** 2 év

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310590

**11. Egyéb előírások:** -

**12. Az engedély érvényessége:** 2020. június 9.

**Budapest, 2010. június 9.**

**MgSzH  
elnök  
nevében és megbízásából**

**Tóthné Lippai Edit  
igazgató**